




**Cruz Roja
Americana**

Empower GROUP O CARE

Mejora en la gestión del grupo sanguíneo O



Las cifras a nivel nacional revelan una escasez crónica de glóbulos rojos O negativo. El declive en la cantidad de donantes y los cambios en su demografía son los obstáculos que afectan el suministro de sangre. La tendencia actual debe cambiar.

Debemos actuar ahora para garantizar la disponibilidad de los productos sanguíneos para quienes más lo necesitan.

Empower Group O Care está diseñado para fortalecer la resiliencia en el suministro de sangre mediante la promoción de prácticas de gestión sostenibles. El uso responsable de la sangre O negativo y O positivo es indispensable para garantizar su disponibilidad para quienes la necesiten.

	Preparativos	Qué hacer en caso de una transfusión de emergencia
Planifique	Implemente protocolos básicos para gestionar las transfusiones de emergencia de pacientes con grupos sanguíneos desconocidos.	Si desconoce el grupo sanguíneo, transfunda glóbulos rojos O positivo a quienes hayan superado la edad reproductiva. Mantenga en reserva glóbulos rojos O negativo para pacientes de dicho grupo sanguíneo o para mujeres en edad reproductiva cuyo grupo sanguíneo se desconozca.
	Almacene y pida con antelación glóbulos rojos con antígenos específicos antes de los procedimientos.	En la medida de lo posible, proporcione unidades de tipos sanguíneos específicos.
Cambie cuanto antes	Implemente políticas para acelerar la recolección de muestras y las pruebas en pacientes con grupos sanguíneos desconocidos.	Después de realizar las pruebas previas a la transfusión, realice la transición del paciente según el tipo sanguíneo específico.
	Implemente protocolos básicos que indiquen cuándo realizar la transición de pacientes con sangre O negativo a transfusiones de O positivo antes de que el inventario se agote, como en casos de hemorragias graves o escasez crítica.	Realice la transición de los pacientes a transfusiones de glóbulos rojos O positivo antes de que se agote el inventario de O negativo o se retrase una transfusión de sangre.
Conozca adónde van sus unidades de sangre tipo O	Realice auditorías para entender los patrones de uso de O negativo, evalúe las transfusiones de O negativo proporcionadas a pacientes que no son de dicho grupo sanguíneo y examine las transfusiones y devoluciones de unidades sanguíneas.	Mantenga en reserva glóbulos rojos O negativo para pacientes de dicho grupo sanguíneo o para mujeres en edad reproductiva cuyo grupo sanguíneo se desconozca.
	Reduzca gradualmente los niveles de inventario si una cantidad significativa de unidades de O negativo próximas a vencer se administra a pacientes que no son de este grupo sanguíneo para evitar su caducidad.	Realice una revisión para asegurarse de que se siguieron los procedimientos de transfusión de emergencia después del alta médica de emergencia.
Opciones seguras	Elabore una política (o políticas) para monitorear a los pacientes con Rh negativo por aloinmunización después de recibir transfusiones Rh positivo.	Examine a los pacientes con Rh negativo después de recibir una transfusión Rh positivo para evaluar el desarrollo de anticuerpos anti-D.
	Elabore políticas sobre cuándo se debe considerar la profilaxis Rh con inmunoglobulinas.	Brinde información y recursos para los pacientes que se aloinmunizan.
Prepárese	Asegúrese de que el personal del banco de sangre esté capacitado y preparado para implementar las políticas y los protocolos de transfusión de emergencia.	Realice simulaciones, ejercicios y simulacros de transfusiones de emergencia para asegurar la preparación del personal.
	Instruya al personal sobre el riesgo de aloinmunización y la seguridad de los glóbulos rojos O positivos para generar confianza.	